



Rosa Clinophylla.

J. J. Redouté pinx.

Rosier à feuilles penchées.

Superficie de Rouen

Chapuis sculp.

LES ROSES.

43

ROSA CLINOPHYLLA.

R. ⁽¹⁾ *Germibus globosis, caule pedunculisque sericeo-villosis; petiolo glanduloso villosis subaculeatis; stipulis fimbriatis; foliis 9-11, oblongo-ellipticis duplicato-serratis, supra lucidis subtus tomentosis; aculeis caulibus rectis geminatis. (N.)*

ROSIER A FEUILLES PENCHÉES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, lisse, sarmenteux, ne paraît pas s'élever à plus de trois ou quatre pieds. Ses tiges, couvertes d'un duvet court, serré, blanchâtre, soyeux, sont armées çà-et-là, mais sur-tout à la base des stipules des feuilles, d'aiguillons fins, droits et geminés. Ses feuilles sont alternes, et penchées d'une manière très-remarquable. Les folioles, au nombre de neuf, souvent de onze, elliptiques, presque toujours doublement dentées, d'un vert gai, luisantes en-dessus, tomenteuses en-dessous, sont supportées par des pétioles velus, glanduleux, quelquefois munis de deux ou trois aiguillons petits et crochus. Les stipules sont frangées, à divisions

(1) CAULIS fruticosus sericeo-villosus. RAMI teretes villosi. ACULEI stipulares duo. FOLIA alterna, pinnata, propendens. FOLIOLI opposita, subsessilia oblongo-elliptica duplicato-serrata, supra lucida, subtus villosa. PETIOLI glandulosi, villosi, subaculeati, aculeis, 2, 3, recurvis, minimis. STIPULAE lineares, fimbriatae, acuminatae. PEDUNCULI sepals sessilibus, aliquando gemini, etiam terni, brevissimi, villosi. GERMEN globosum, villosum, calice floralibus alteris hemisphaeisque nonnullis subobtusum. LOBI CALICIS indivisi, seminati, sericeo-villosi. PISTILLA 5, alba, obcordata, basi flavescens. FRUCTUS subglobosus. Maturum non vid. (N.)